

757-26



Junta Departamental de Cerro Largo

Melo, 28 de Agosto de 2026.-

Oficio N° 699/2026

S.N.

Congreso Nacional de Ediles
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca
Presente

De nuestra mayor consideración:


Por la presente, cumplimos en comunicar que el Sr. Edil Hugo Desplast, en la media hora previa de la sesión ordinaria de fecha 27 de agosto del corriente, manifestó su preocupación ante la presencia del zorro de monte, el zorro gris y el jabalí. Estas especies representan una grave amenaza para el sector agropecuario: en la ganadería, provocan pérdidas por depredación de ovinos; en la agricultura, causan severos daños al pisotear y consumir los cultivos. La situación se agrava al considerar que estos animales actúan como amplificadores y transmisores de patógenos de alto impacto en la salud humana y animal.

Para mayor ilustración, se adjunta las palabras expresadas en Sala por el Sr. Edil.

La Junta hace constar que se limita a dar curso al planteo, tal como lo dispone el Artículo 24 del Reglamento Interno.

Sin otro particular saludan a usted atentamente.


Alejandro López
Presidente


Macarena Rebollo
Secretario



Fraille Muerto 27 de agosto de 2026.

ZORRO Y JABALÍ....DAÑOS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

En el contexto productivo de Uruguay, el zorro de monte y el zorro gris, representan una de las mayores amenazas para la majada ovina, focalizando su daño en la época de parición.

Predación de corderos: Los zorros atacan principalmente a los corderos recién nacidos o de pocos días de vida. Aprovechan el momento del parto o las primeras horas de vulnerabilidad del animal para atacar puntos críticos como el cuello, la cabeza o la zona inguinal.

Las bajas en las majadas por depredación directa reducen significativamente el porcentaje de corderos logrados por hectárea, afectando el ingreso de los productores familiares y ovinocultores.

Transmisión de parásitos:

El zorro actúa también como huésped definitivo de la *Echinococcus granulosus*, la tenacidad responsable de la hidatidosis.

Al defecar en los pastos, contamina el ambiente con huevos del parásito que luego son ingeridos por las ovejas y las personas.

El control de estas especies en el campo uruguayo combina el uso de perros protectores de rebaño, la instalación de electrificación rural, el encierro nocturno de las majadas en época de parición y la gestión sanitaria coordinada.

El jabalí dejó de ser una especie silvestre más para convertirse en uno de los problemas ambientales y sanitarios más complejos de esta zona del continente.

Su capacidad de adaptación, la ausencia de depredadores naturales de gran tamaño y su alta tasa reproductiva aceleraron una expansión que genera serias complicaciones para la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas.

Como especie exótica invasora, el jabalí modifica drásticamente los suelos al hurgar con su hocico en busca de raíces, invertebrados y tubérculos. Este comportamiento destruye la cobertura vegetal nativa, acelera la erosión del suelo y facilita la proliferación de malezas oportunistas.

En el sector agrícola, causa pérdidas millonarias al pisotear y consumir cultivos de maíz, soja, arrozales,

girasol, pasturas y cereales de invierno, además de atacar fauna autóctona y preñar sobre corderos o terneros recién nacidos.

Desde la perspectiva epidemiológica, el jabalí funciona como un amplificador y transmisor de patógenos de alto impacto en la salud pública y animal.

Fiebre Aftosa y Peste Porcina: Representa un riesgo crítico de reintroducción o dispersión de enfermedades virales que amenazan los estatus sanitarios de los países agroexportadores.

Tuberculosis Bovina:

Actúa como reservorio silvestre, manteniendo la bacteria en el medio ambiente y reinfectando al ganado bovino que comparte pasturas.

Brucelosis:

Transmisible tanto a los animales ganaderos como a los cazadores y manipuladores de carne mediante contacto directo.

Triquinosis:

Un parásito intestinal y muscular que infecta al ser humano por el consumo de carne de jabalí mal cocida o sin los análisis de laboratorio correspondientes.

Vector de garrapatas y parásitos externos:

El pelaje denso y sus desplazamientos por montes tupidos convierten al jabalí en un transporte masivo de parásitos externos. Transportan especies de garrapatas, dispersándolas hacia nuevas